

נוהל מסי' 03.10.01.33	מהדורה 2020-2	תוקף מתאריך 07.2015	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם : פרטוקול הכנה לפני הזרקת חומר ניגוד לווריד			

הנחיות להכנה לפני הזרקת חומר ניגוד לווריד
שלום רב,

הנך מוזמן/ת לבדיקת MRI, הכוללת הזרקת חומר ניגוד. עקב רגישות / מצב רפואי הנך נדרש/ת לבצע הכנה לבדיקה כמפורט. במידה וההנחיות אינן ברורות, יש להתייעץ עם רופא המשפחה / הרופא המטפל.

מבוגרים או נערים מעל גיל 15 :

1. **Prednisone 50 mg X3** - יש לקחת שלוש מנות של פרדניזון 50 מ"ג (כל מנה), לפי פרקי הזמן הבאים :
 - א. 13 שעות טרם הבדיקה (2.5 כדורים של 20 מ"ג)
 - ב. 7 שעות טרם הבדיקה (2.5 כדורים של 20 מ"ג)
 - ג. 1 שעה טרם הבדיקה (2.5 כדורים של 20 מ"ג)

2. **Loratadine** - כדור אחד של 10 מ"ג כשעתיים לפני הבדיקה, או **Desloratadine**, כדור אחד של 5 מ"ג כשעתיים לפני הבדיקה.

הנחיות להכנה לילד עד גיל 15 :

1. **פרדניזון** או **פרדניזולון**, במינון של 0.5 מ"ג לק"ג משקל (כל מנה). יש לחלק את המינון לשלוש מנות (לפי המפורט בהמשך), המינון המקסימלי יהיה 50 מ"ג ליום.

על הרופא המטפל להנחות את ההורה לגבי המינון והחלוקה למנות.

 - א. מנה ראשונה: 13 שעות טרום בדיקה .
 - ב. מנה שנייה: 7 שעות טרום בדיקה .
 - ג. מנה שלישית: שעתיים טרום בדיקה .

2. **Diphenhydramine/Benadryl** במינון 1 מ"ג לק"ג משקל, כשעתיים לפני הבדיקה – תוספת לילדים מעל גיל 6. את המנה השלישית והבנדריל, יש לשתות עם כמות מינימלית של מים במידה ואתה צפוי לעבור את הבדיקה בהרדמה.